

# **ИНСТРУКЦИЯ**

## **по применению Апистима**

### **для стимуляции развития пчелиных семей**

**(организация – разработчик: ООО «Аписфера 2000», г. Москва)**

#### **1. Общие сведения**

1. Апистим (Apistim) – кормовая добавка, предназначенная для стимуляции развития пчелиных семей.

2. Апистим содержит: калий фосфорнокислый - 25%, магний сернокислый -36 % и кобальт хлористый - 1,2%, а также сахарозу - до 100%.

Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.

3. По внешнему виду Апистим представляет собой порошок бело-розового цвета со слабым специфическим запахом, растворимый в воде.

4. Выпускают Апистим расфасованным по 10 г в трехслойные фольгированные пакеты.

Каждую единицу упаковки маркируют на русском языке с указанием: наименования организации-изготовителя, ее адреса и товарного знака, названия кормовой добавки, массы нетто, состава и гарантированных показателей, назначения и способа применения, номера партии, даты изготовления, срока и условий хранения, информации о подтверждении соответствия, номера государственной регистрации, штрихового кода, надписи «Для животных» и снабжают инструкцией по применению.

Хранят Апистим в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от минус 10°С до 30 °С.

Срок хранения Апистима при соблюдении условий хранения — 2 года со дня производства.

Запрещается использовать Апистим по истечении срока хранения.

#### **II. Биологические свойства**

5. Входящие в состав Апистима микроэлементы усиливают репродуктивные свойства пчелиных маток и оказывают стимулирующее действие на развитие и продуктивность пчел.

Апистим нетоксичен для пчел, в рекомендуемой дозе не оказывает отрицательного влияния на жизнедеятельность и продуктивность семей пчел, не накапливается в продуктах пчеловодства.

#### **III. Порядок применения**

6. Апистим применяют для стимуляции развития семей пчел.

7. Перед применением Апистим вносят в теплый сахарный сироп, приготовленный в соотношении 1:1, из расчета 10 г Апистима на 5 л сиропа.

В весенний период сироп с Апистимом наливают в верхние кормушки ульев из расчета 200-300 мл на одну семью пчел и скармливают пчелам через 1 день в течение 2-х недель.

В летне-осенний период сироп с Апистимом скармливают семьям пчел после откачки меда по 2 - 5 л в зависимости от силы пчелиных семей. Сироп дают пчелам через день по 500-1000 мл в кормушках после окончания лета пчел.

Для поения пчел Апистим добавляют в поилку с водой из расчета 10 г на 5 л воды.

8. При применении Апистима в рекомендованных количествах побочных явлений и осложнений не отмечено. Противопоказаний не установлено.

9. Мед, полученный от семей пчел, обработанных кормовой добавкой Апистим в соответствии с настоящей инструкцией, используют в пищевых целях без ограничений.

#### **IV. Меры личной профилактики**

10. При работе с Апистимом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

11. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть с мылом лицо и руки. При случайном контакте кормовой добавкой с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды.

12. Апистим следует хранить в недоступном для детей месте.

Инструкция разработана разработчиком: ООО «Аписфера 2000», г. Москва.

Адрес организации-производителя: ООО НПЦ «Фокс и Ко», 117149, г. Москва, Сиферопольский б-р, д. 8.

Рекомендован к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Регистрационный номер ПВР-2-6.6/01816