

ИНСТРУКЦИЯ

по применению препарата Апитак для лечения варроатоза пчел
(организация – разработчик: ООО «Аписфера 2000» г. Москва)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Апитак (Aritak).

Международное непатентованное наименование лекарственного препарата: амитраз.

2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

Апитак содержит в качестве действующего вещества амитраз – 12,5%, а в качестве вспомогательных веществ эфирное масло чабреца – 1,5%, неонол – 2% и ксилол – до 100%. По внешнему виду Апитак представляет собой прозрачную маслянистую бесцветную до светло-желтого цвета жидкость со специфическим запахом.

Выпускают препарат Апитак расфасованным по 0,5 и 1,0 мл в стеклянные ампулы. По 2 ампулы упаковывают в коробки из картона с разделительными перегородками. Каждую упаковку снабжают инструкцией по применению.

3. Срок годности препарата при соблюдении условий хранения – 2 года со дня производства. Запрещается использовать Апитак по истечении срока годности.

4. Хранят Апитак в закрытой упаковке производителя в сухом, защищённом от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0°C до 25°C.

5. Апитак следует хранить в недоступном для детей месте.

6. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Апитак – акарицидный препарат.

Амитраз, входящий в состав препарата Апитак, обладает острым акарицидным действием против взрослых форм клещей *Varroa destructor*. Механизм действия амитраза заключается в блокировании передачи нервных импульсов, что вызывает нарушение координации движений, паралич и гибель клещей.

Апитак по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), не оказывает кожно-резорбтивного, местно-раздражающего и сенсibilизирующего действия.

Препарат не токсичен для пчёл, в рекомендуемой препаративной форме и дозе не оказывает отрицательного влияния на жизнедеятельность и продуктивность семей пчёл, не накапливается в продуктах пчеловодства.

III. Порядок применения

8. Апитак применяют для лечения варроатоза пчел после окончания медосбора, в осенний период при отсутствии расплода в семьях пчёл.

9. Противопоказания к применению не установлены. Не рекомендуется проводить обработки пчелиных семей при температуре воздуха ниже 10°C.

10. Перед применением 1 мл препарата разводят в 2-х литрах тёплой (35-40°C) кипячёной воды до получения равномерной эмульсии. Приготовленный раствор набирают в шприц и поливают находящихся в улочках пчёл из расчёта 10 мл на одну улочку. Лечебные обработки проводят двукратно с интервалом 7 дней.

11. Превышение разовой дозы препарата может приводить к выкучиванию и повышенной гибели пчёл.

12. Особенности действия лекарственного препарата при первом применении или при его отмене не выявлено.

13. В случае несоблюдения установленного срока повторных обработок, применение препарата следует возобновить в той же дозировке по той же схеме.

14. При применении препарата Апитак в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается.

15. Сведения о несовместимости Апитак с другими лекарственными препаратами и кормовыми добавками отсутствуют.

16. Мёд, полученный от семей, обработанных препаратом Апитак в соответствии с настоящей инструкцией, используют без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с препаратом Апитак следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами, пользоваться резиновыми перчатками.

18. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть с мылом лицо и руки. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом Апитак. В случае появления аллергических реакций или случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустые упаковки из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация – производитель: ООО НПЦ «Фокс и Ко», 117149, г. Москва, Симферопольский б-р, д. 8.

Инструкция разработана ООО «Аписфера 2000», 109544, г. Москва, Новорогожская ул., д. 28, кв. 40.

С утверждением настоящей инструкции считать утратившей силу инструкцию по применению Апитака, утверждённую Россельхознадзором 30 июня 2006 года.

Рекомендован к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Номер регистрационного удостоверения 77-3-9.13-1398№ПВР-3-5.5/01622