

# ИНСТРУКЦИЯ

по применению препарата Муравьинка® для лечения  
варроатоза и акарапидоза пчёл  
(организация-разработчик:ООО «Аписфера 2000» г.Москва)

## I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Муравьинка® (Muravinka).

Международное непатентованное наименование лекарственного препарата: муравьиная кислота

2. Лекарственная форма: гель для наружного применения.

Муравьинка® содержит в качестве действующего вещества муравьиную кислоту – 85%, а в качестве вспомогательных веществ натрий-карбоксиметилцеллюлозу – 12% , агидол-1 – 0,1% и воду питьевую очищенную до 100%. По внешнему виду представляет собой бесцветную гелеобразную массу с резким запахом муравьиной кислоты.

Выпускают Муравьинку® упакованной по 30 г в пакетах из кислотопроницаемого нетканого материала, размером 40 x 70 мм, уложенных по 4 штуки в полимерные банки с контролем первого вскрытия. Каждую банку снабжают инструкцией по применению.

3. Срок годности препарата при соблюдении условий хранения – 2 года со дня производства. Запрещается использовать Муравьинку® по истечении срока годности.

4. Хранят Муравьинку® в закрытой упаковке производителя в сухом, защищённом от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0°С до 35°С.

5.Муравьинку® следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

## II. Фармакологические свойства

7. Муравьинка® – акарицидный препарат.

Муравьиная кислота, входящая в состав препарата обладает острым акарицидным действием против взрослых форм клещей *Varroa destructor* и *Acarapis woodi*.

Муравьинка® по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), обладает местно-раздражающим действием на кожу, слизистые оболочки верхних дыхательных путей и конъюнктиву глаз.

Препарат не токсичен для пчёл, в рекомендуемой препаративной форме и дозе не оказывает отрицательного влияния на жизнедеятельность и продуктивность семей пчёл, не накапливается в продуктах пчеловодства.

## III. Порядок применения

8. Муравьинку® применяют приварроатозе и акарапидозе пчёл.

9. Противопоказано применение препарата при температуре внешнего воздуха ниже 12°С и выше 25 °С.

10. Обработку пчелиных семей при варроатозе проводят двукратно, а при акарапидозе – трехкратно, с интервалом 7 дней из расчёта 1 пакет на 1 семью силой 5-12 улочек. Обработку проводят одновременно во всех ульях на пасеке – весной, после первого осмотра пчёл и в летне-осенний период после откачки товарного мёда.

Перед применением вскрывают банку, извлекают пакет и располагают его на верхних брусках соторамок под холстиком. По мере испарения кислоты пакеты извлекают из ульев и утилизируют. В обрабатываемых семьях пчёл должна быть обеспечена хорошая вентиляция.

Во избежание попадания препарата в товарный мёд, обработку семей пчёл прекращают не позднее чем за 14 дней до начала главного медосбора.

11. При передозировке препарата наблюдается беспокойство и выкучивание пчёл из ульев. Не рекомендуется обрабатывать семьи пчёл менее 5 улочек.

12. Особенности действия лекарственного препарата при первом приёме или при его отмене не выявлено.

13. В случае несоблюдения установленного срока повторных обработок применение препарата следует возобновить в той же дозировке по той же схеме.

14. При применении Муравьинки® в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается.

15. Сведения о несовместимости Муравьинки® с другими лекарственными препаратами и кормовыми добавками отсутствуют.

16. Мёд, полученный от семей, обработанных препаратом Муравьинка® в соответствии с настоящей инструкцией, используют на без ограничений.

#### **IV. Меры личной профилактики**

17. При работе с Муравьинкой® следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами, пользоваться резиновыми перчатками и респиратором.

18. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть с мылом лицо и руки. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Муравьинкой®. В случае появления аллергических реакций или случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустые упаковки из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация – производитель: ООО НПФ «Фокс и Ко», 117149, г. Москва, Сиферопольский б-р, д. 8.

Инструкция разработана ООО «Аписфера 2000», 117149, г. Москва, Сиферопольский б-р, д.8.

С утверждением настоящей инструкции считать утратившей силу инструкцию по применению Муравьинки®, утверждённую Россельхознадзором 6 декабря 2005 года.

Рекомендованк регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Номер регистрационного удостоверения 77-3-12.12-0906№ПВР-3-1.5/01452