

ИНСТРУКЦИЯ

по применению препарата Ветфор® для лечения варроатоза пчёл
(организация-разработчик: ООО «Аписфера 2000» г. Москва)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Ветфор® (Vetfor).

Международное непатентованное наименование лекарственного препарата: флувалинат, амитраз

2. Лекарственная форма: пластины из древесного шпона, пропитанные акарицидным составом для наружного применения.

Ветфор® содержит на одну пластину в качестве действующего вещества флувалинат – 80 мг и амитраз – 5,0 мг, в качестве вспомогательных компонентов пихтовое масло – 0,02 мл, диметилсульфоксид – 2 мл, шпон древесный.

По внешнему виду представляет собой деревянные пластины размером 200 x 25 x 1 мм.

Выпускают Ветфор® упакованным по 10 пластин в трехслойные фольгированные пакеты. Каждую упаковку снабжают инструкцией по применению.

3. Срок годности препарата при соблюдении условий хранения – 2 года со дня производства. Запрещается использовать Ветфор® по истечении срока годности.

4. Хранят Ветфор® в закрытой упаковке производителя в сухом, защищённом от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0°C до 30°C.

5. Ветфор® следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Ветфор® – акарицидный препарат.

Флувалинат и амитраз, входящие в состав препарата, обладают акарицидным действием против взрослых форм клещей *Varroa destructor*. пчёлы, контактируя с пластиной, переносят действующие вещества на своё тело, на котором находятся клещи. Попадая в организм клещей, флувалинат и амитраз блокируют передачу нервных импульсов, что вызывает нарушение координации движений, паралич и гибель паразитов.

Ветфор® по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), не оказывает кожно-резорбтивного, местно-раздражающего и сенсibiliзирующего действия.

Препарат не токсичен для пчёл, в рекомендуемой дозе не оказывает отрицательного влияния на жизнедеятельность и продуктивность семей пчёл, не накапливается в продуктах пчеловодства.

III. Порядок применения

8. Ветфор® применяют для лечения варроатоза пчёл.

9. Противопоказания к применению не установлены. Не рекомендуется проводить обработки пчелиных семей при температуре воздуха ниже 10°C.

10. Обработку пчелиных семей при варроатозе проводят однократно, путём внесения пластин в ульи из расчёта 1 пластина на 3-5 улочек пчёл. Время нахождения пластин в семьях: при наличии расплода – 25-30 дней; в безрасплодный период- 5- 7 дней.

Обработку проводят одновременно во всех ульях на пасеке – весной, после первого осмотра пчёл и в летне-осенний период после откачки товарного мёда.

Перед применением вскрывают упаковку, извлекают пластину, на одном из концов пластины проделывают отверстие, в которое продевают V-образный крючок и размещают пластину в межрамочном пространстве вертикально по центру улочки.

Во избежание попадания препарата в товарный мёд, обработку семей пчёл прекращают не позднее чем за 14 дней до начала главного медосбора.

11. При передозировке препарата наблюдается беспокойство и выкучивание пчёл из ульев.

12. Особенности действия лекарственного препарата при первом применении или при его отмене не выявлено.

13. Следует избегать нарушений режима применения препарата, так как это может привести к снижению эффективности.

14. При применении Ветфора® в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается.

15. Сведения о несовместимости Ветфора® с другими лекарственными препаратами и кормовыми добавками отсутствуют.

16. Мёд, полученный от семей, обработанных препаратом Ветфор® в соответствии с настоящей инструкцией, используют без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с Ветфором® следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами, пользоваться резиновыми перчатками.

18. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть с мылом лицо и руки. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Ветфором®. В случае появления аллергических реакций или случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустые упаковки из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация – производитель: ООО НПФ «Фокс и Ко», 117149, г. Москва, Сиферопольский б-р, д. 8.

Инструкция разработана ООО «Аписфера 2000», 109544, г. Москва, Новорогожская ул., д. 28, кв. 40.

Рекомендован к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Номер регистрационного удостоверения 77-3-9.13-1400№ПВР-3-3.6/01876